



Drugie rzuty

Drugie rzuty często są wyznacznikiem udanej uprawy, zarówno w przypadku uprawy odmian białych jak i brązowych pieczarek. Po pierwszym rzucie następuje wyprowadzanie już istniejących zawiązków ponieważ zawiązki drugiego rzutu, podobnie jak i pierwszego powstają w trakcie szoku. Dlatego ważne jest aby podlewanie pod drugi rzut nie trwało zbyt długo. W przypadku rasy brązowej, która wymaga stałego odparowania, ważne aby łączna dawka wody nie była zbyt obfita (6-8l/m²) – możliwy brak odparowania znacznie ograniczy liczbę zawiązków. Dawki wody dla odmian białych mogą być znacząco wyższe – od 8 do nawet 14 litrów na metr kwadratowy uprawy. Wielkość dawki jest uzależniona od plonu uzyskanego w I rzucie oraz od aktywności podłoża. Przy większej aktywności podłoża często utrzymuje się wyższe temperatury powietrza po podlaniu (19-20 °C) aby ograniczyć ilość zawiązków drugiego rzutu, przy aktywności mniejszej zabieg ten jest niepożądany ponieważ może zbyt ograniczyć ich liczbę. Kolejnym elementem decydującym o dobrym drugim rzucie jest okrywa, a dokładnie jej stan po pierwszym rzucie. Im bardziej przeschnięta okrywa tym trudniej ją z powrotem nawodnić. Dlatego dobrze jest po pierwszej dawce wody odczekać do kolejnej 2-3 godziny aby okrywa mogła się odbudować. Poza przeschnięciem często dochodzi do uszkodzeń mechanicznych okrywy w wyniku zbyt intensywnego jej czyszczenia po I rzucie, łatwo wtedy uszkodzić zawiązki drugiego rzutu i znacząco go osłabić. Co pokazuje że ważna jest obserwacja nie tylko parametrów uprawy, lecz także personelu.